

EXERCICES

Hiérarchiser et coder les diagnostics

Cas 1 - Homme 52 ans, adressé pour rééducation

Tétraplégie post-traumatique

Cette semaine : Rééducation

Infection urinaire sur sonde urinaire à demeure

Apprentissage et ajustements du fauteuil électrique

FPPC	Rééducation	Z50.1
MMP	Tétraplégie SAI	G82.5
A. étiol.	?	
DA signif.	Infection urinaire sur sonde Fauteuil électrique	T83.5 Z46.8

Quel était le traumatisme ? Il manque une information.

Cas 2 - Garçon 14 ans, adressé pour rééducation Amputation de la jambe gauche (AVP) Asthmatique

Cette semaine : Mise en place et ajustement d'une prothèse de jambe
Crise d'asthme rapidement résolutive

FPPC	Mise en place et ajustement d'une prothèse de jambe	Z44.1
MMP	Absence acquise de la jambe gauche	Z89.5
A. étiol.	Amputation traumatique de la jambe gauche	S88.9
DA signif.	Asthme	J45.9

Le choix de l'affection étiologique est discutable : on ne sait, en fait, s'il s'agit d'une amputation traumatique, ou d'une amputation chirurgicale en raison, par ex. d'un écrasement (S87)

Sous le code Z89.6, l'inclusion «Jambe SAI» a le sens de «membre inférieur SAI»

Cas 3 - Fille 12 ans, en attente de greffe rénale, hospitalisée pour surveillance entre séances de dialyse

Bénéficiaire par ailleurs d'une prise en charge éducative dans l'établissement

Cette semaine : 3 séances de dialyse à l'extérieur de l'établissement

FPPC	Surveillance, soins préparatoires en vue d'une dialyse	Z49.1
MMP	Dépendance envers une dialyse rénale	Z99.2+8
A. étiol.	Insuffisance rénale	N18
DA signif.	Prise en charge éducative	Z62.2

Dans le cas d'un code Z en FPPC et en MMP, il faut obligatoirement renseigner l'affection étiologique.

Attention ! Ne pas oublier de noter dans le RHS, sous la rubrique actes médicaux, l'acte de dialyse

Cas 4 - Homme 36 ans, adressé pour soins palliatifs SIDA en phase terminale Sarcome de Kaposi

Cette semaine : Traitement d'une pneumopathie d'inhalation

FPPC	Prise en charge d'une affection aiguë	<i>ZAIGU</i>
MMP	Pneumopathie d'inhalation	J69.0
A. étiol.		
DA signif.	Soins palliatifs SIDA en phase terminale Sarcome de Kaposi	Z51.5 B21.0 C46.9

Cas 5 - Homme 28 ans, adressé pour prise en charge d'une obésité

Cette semaine :

Très perturbé (névrose d'angoisse connue : avis psychiatrique,

Mise en route d'une psychothérapie

Prise en charge nutritionnelle non réalisée

FPPC	Mise en route d'une psychothérapie	Z50.4
MMP	Névrose d'angoisse	F41.1
A. étio.		
DA signif.	Obésité Prise en charge nutritionnelle impossible	E66.9 Z53.8

On a choisi F41.1 bien que l'information soit «très perturbé» et non «névrose d'angoisse». On peut hésiter entre Z53.0 et Z53.8

Cas 6 - Homme 47 ans, adressé pour rééducation suite à un AVP
Fracture ouverte du poignet gauche : fixateurs externes
Fracture de la jambe droite plâtrée
Diabète insulino-dépendant

Cette semaine :

Rééducation impossible : refus du patient

Poursuite des soins de broches, propres

Adaptation des doses d'insuline (glycémies \geq 3 g)

FPPC	Soins de broches	Z47.8
MMP	Porteur de fixateurs externes	Z96.7 Z97.8
A. étiol.	Fracture ouverte du poignet gauche	S62.81
DA signif.	Fracture de la jambe droite Diabète insulino-dépendant Rééducation impossible : refus du patient	S82.90 E10.9 Z53.2

Pas de code plus précis que Z98.8 pour les fixateurs externes

N.B. les codes à cinq caractères pour les fractures