

Modifications de la CIM-10 introduites en 2021

Pour l'année 2021, l'ATIH édite une version actualisée complète de la liste analytique du volume 1 de la CIM-10 à usage PMSI. Cette version (CIM-10-FR 2021) sera publiée au *Bulletin officiel 2021/9 bis*, et est consultable et téléchargeable sur [le site Internet de l'ATIH](#).

La présente note décrit tout d'abord les principales modifications liées aux mises à jour introduites dans le volume 1 de la CIM-10 pour 2021 puis les restitue en détail. Dans cette seconde partie, générée automatiquement par le logiciel CTK (Classification Tool Kit) utilisé pour la gestion et la publication de la CIM-10, les suppressions de texte sont mentionnées en police rayée bleue et les ajouts en police rouge, et ce, quelle que soit l'origine, OMS ou ATIH, de ces modifications. Les codes encadrés par une bordure en pointillées sont des modifications apportées par l'ATIH pour les besoins du PMSI.

1. Modifications apportées par l'OMS

Des modifications infraannuelles de l'OMS ont été introduites en octobre 2020 dans la CIM-10 à usage PMSI. Elles concernaient trois nouveaux codes à usage urgent de description de situations cliniques observées dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 :

U08.9 Antécédents personnels de COVID-19, sans précision

U09.9 Affection post COVID-19, sans précision

U10.9 Syndrome inflammatoire multisystémique associé à la COVID-19, sans précision

Ces codes sont portés en diagnostic associé sauf pour U08.9 qui est aussi admis en DP et DR.

Les consignes de codage de ces diagnostics sont publiées sur le [site de l'ATIH](#).

2. Modifications apportées par l'ATIH

Subdivision de libellé

Des extensions à usage PMSI sont créées pour tous les libellés de la catégorie *G82 Paraplégie et tétraplégie* :

G82.0 Paraplégie flasque

G82.00 Paraplégie flasque, complète motrice

G82.01 Paraplégie flasque, incomplète motrice

G82.09 Paraplégie flasque, sans précision

G82.1 Paraplégie spastique

G82.10 Paraplégie spastique, complète motrice

G82.11 Paraplégie spastique, incomplète motrice

G82.19 Paraplégie spastique, sans précision

G82.2 Paraplégie, sans précision

Paralysie des deux membres inférieurs SAI

Paraplégie (inférieure) SAI

- G82.20 Paraplégie complète motrice, sans précision*
- G82.21 Paraplégie incomplète motrice, sans précision*

- G82.3 Tétraplégie flasque*
- G82.30 Tétraplégie flasque, complète motrice*
- G82.31 Tétraplégie flasque, incomplète motrice*
- G82.39 Tétraplégie flasque, sans précision*

- G82.4 Tétraplégie spastique*
- G82.40 Tétraplégie spastique, complète motrice*
- G82.41 Tétraplégie spastique, incomplète motrice*
- G82.49 Tétraplégie spastique, sans précision*

- G82.5 Tétraplégie, sans précision*
- Quadriplégie SAI*
- G82.50 Tétraplégie complète motrice, sans précision*
- G82.51 Tétraplégie incomplète motrice, sans précision*

Ces subdivisions permettent de décrire le caractère complet (paralysie vraie) ou incomplet (parésie) de l'atteinte. Elles sont données à titre facultatif et peuvent être utilisées comme cinquième caractère supplémentaire. Elles gardent les mêmes caractéristiques de classification que les codes pères.

À cet effet, un nouveau paragraphe est ajouté à la note d'utilisation de la catégorie G82.

Modifications de libellé

L'ATIH propose une nouvelle écriture des libellés des codes d'aplaspie médullaire D60.-0 et D61.-. L'utilisation de ces codes reste inchangée.

Le libellé du code U07.12 est aussi modifié. Il garde les mêmes indications d'utilisation pour le codage.

Ajout de notes

L'ATIH ajoute la note d'utilisation du code OMS à usage urgent *U07.0 Affections liées au vapotage*, qui précise les différentes indications d'utilisation de ce code.

Toutes ces modifications sont précisées ci-dessous :

Chapitre III

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50-D89)

Anémias médullaires [aplastiques] et autres anémies (D60-D64)

-
- D60 **Anémie** médullaire [aplastique] acquise pure **des globules rouges** [érythroblastopénie]
Comprend :
érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec thymome)
- D60.0 **Anémie** médullaire [aplastique] acquise pure **des globules rouges**, chronique
- D60.1 **Anémie** médullaire [aplastique] pure, **Aplasia médullaire acquise pure des globules rouges**, transitoire
- D60.8 Autres **anémies** **aplasies** médullaires [aplastiques] acquises pures **des globules rouges**
- D60.9 **Anémie** médullaire [aplastique] acquise pure **des globules rouges**, sans précision
-
- D61 **Autres anémias** médullaires [aplastiques]
À l'exclusion de :
agranulocytose (D70)
- D61.0 **Anémie** médullaire [aplastique] constitutionnelle
Anémie (de):
 - Fanconi
 - hypoplasique familialeErythroblastopénie (pure) (du):
 - congénitale
 - nourrisson
 - primairePancytopénie avec malformations
Syndrome de Blackfan-Diamond
- D61.1 **Anémie** médullaire [aplastique] médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- D61.2 **Anémie** médullaire [aplastique] due à d'autres agents externes
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
- D61.3 **Anémie** médullaire [aplastique] idiopathique
- D61.8 Autres **anémias** médullaires [aplastiques] précisées
- D61.9 **Anémie** médullaire [aplastique], sans précision
Anémie hypoplasique SAI
Hypoplasie médullaire
Panmyélophthisie

Chapitre VI Maladies du système nerveux (G00-G99)

Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)

G82 Paraplégie et tétraplégie

Note : Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types de paraplégie et tétraplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

À l'exclusion de :

paralysies cérébrales congénitales (G80.-)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme cinquième caractère supplémentaire avec les souscatégories G82.-. Elles décrivent le caractère complet ou incomplet de l'atteinte médullaire selon les grades AIS (ASIA Impairment Scale), associé ou non à une atteinte sensitive :

0 complète motrice

1 incomplète motrice

9 sans précision

Chapitre XXII Codes d'utilisation particulière (U00-U99)

Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine (U00-U49)

U07 Codes pour usage urgent

U07.0 Affection liée au vapotage

Affection liée à la cigarette électronique [e-cigarette]

Affection liée au dabbing

Atteinte pulmonaire liée à la cigarette électronique

Atteinte pulmonaire liée au dabbing

EVALI - [lésion pulmonaire associée à l'utilisation de e-cigarette ou de vapotage]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la pneumonie ou d'autres manifestations cliniques

U07.1 COVID-19

U07.12 ~~COVID-19, porteur de~~ Porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique, virus identifié asymptomatique